

Rupture partielle Œdème/ecchymose de l'os tibial

Dr. Toussaint, praticien orthopédique et médecin du sport
Leipzig, Allemagne

- Accident du 28 Juillet 2015 (Radios et IRM réalisés immédiatement au Brésil), Thérapie conservative
Diagnostic : douleurs de mouvement, de stress, épanchement, enflure et lenteur de déplacement
- **Traitement MBST[®]** : OpenSystem 350, 7 séances, douleurs muscles/tendons, (du 10 au 18 Août 2015), OpenSystem 350, Ostéoporose 9 séances (du 19 au 27 Août 2015)
- **Thérapie/ Rééducation**: Physiothérapie globale (KG, manuelle LD, Electrothérapie),
- Du 18 au 31 Août 2015, 1ère séance de physiothérapie ambulatoire avancée, ABE à partir du 1^{er} septembre plus 2 Série physiothérapie ambulatoire avancée jusqu'au 14 septembre 2015 en combinaison avec 1 entrainement par jour.
- Contrôle IRM du 23 septembre 2015
- Retour à la pratique sportive possible (20 septembre 2015 après 6 semaines et demie, l'ecchymose de la main empêche les inserts courts, mais de retour à l'entrainement)

IRM du 25 juillet 2015

IRM du 23 septembre 2015

